

種類	品名	製材	種類	価格(円) /錠	Tmax	半減期	備考	備考
パーキンソン病薬 (非麦角系)	ビ・シフロール	プラミペキソール	0.125 mg	54.2	1.5 時間	6~7 時間	最大 0.75mg まで	
			0.5 mg	186				
	プラミペキソール塩酸塩	ビ・シフロールのジェネリック製品	0.125 mg	29.6	1.5 時間	6~7 時間	最大 0.75mg まで (ジェネリック製品発売 (2013年6月~))	
			0.5 mg	101.3				
	ミラペックスLA	プラミペキソール	0.375 mg	151.2	?	?	徐放化 (効果時間を長くしたもの)	日中にも症状がある患者に有効
	レキップ	ロピニノール	0.25 mg	56.8	1.6 時間	5 時間	0.25mgはビ・シフロールの0.125mgの1/2とほぼ同じ効果があります。最大 4mg まで (欧米では承認済) 日本では未承認	ビ・シフロール0.125mg1錠に対し、0.25mg2錠がほぼ同じ効果あり
			1 mg	196.6				
			2 mg	365.1				
			CR 2 mg	273.6	7 時間	17 時間	徐放化 (効果時間を長くしたもの)	日中にも症状がある患者に有効
			CR 8 mg	941.4				
ドミン	タリペキソール	0.4 mg	151.1	1~2時間	5 時間	日本のみ販売、最大 1.2mg まで	ドミン0.4mgの治療効果はビ・シフロール0.5mgに相当する。	
ニュープロパッチ	ロチゴチン	2.25 mg	270.3	4.5 mgの場合	剥がした後5.3 時間	貼付剤 (肩、上腕部、腹部、側腹部、臀部、大腿部のいずれかに貼る。) 最大 6.75mgまで		
		4.5 mg	416.5	16 時間				
てんかん病薬	レグナイト	ガバペンチン	300 mg	98.5	4~6 時間	4~6 時間	最大 600mgまで (ガバペンチンの叙法化)	痛みを伴うRLSに効果あり?
	リボトリール	クロナゼパム	0.5 mg	9.1	2 時間	27 時間	ランドセンと全く同じ (製薬会社が異なるのみ)	1mgまでが限度か?
			1 mg	15.6				
	ランドセン	クロナゼパム	0.5 mg	9.1	2 時間	27 時間	リボトリールと全く同じ (製薬会社が異なるのみ)	1mgまでが限度か?
			1 mg	15.6				
	ガバペン	ガバペンチン	200 mg	39.3	3 時間	6~7 時間	痛みを伴うRLSに効果あり?	
300 mg			52.8					
テグレートール	カルバマゼピン	100 mg	7.9					
漢方薬	抑肝散 54	顆粒 (包)	2.5 g	29.5			軽度の患者に有効か?	
疼痛治療剤	リリカカプセル	カプセル	25/75/150mg	77/128/176	1時間	6 時間	神経障害性疼痛、線維筋痛症疼痛	
	トラマドール	トラマールOD	25mg	38.6	≒ 1 時間	6~7時間	非麻薬性鎮痛剤、慢性疼痛用、 長期使用の経験は不明	トラマドールの処方方法には特別の注意が必要です。会員専用ページをご覧ください。

注意：①：ビ・シフロールのジェネリック製品 (プラミペキソール) の価格は約55%となっています。

②：徐放化されたレキップ (CR 2mg、CR 8mg) 及びミラペックスLAは一日3回服用している人に便利です。1日1回服用でOK

③：リリカカプセルとトラマールODは欧米でRLS患者に其々3%、5%使用されています。日本では極めて少数です。

④：半減期と血中濃度がTmaxの濃度から半分になるまでの時間を示す。

⑤：薬の価格は2016年度の価格である。年度によって変更される場合があります。